# Пневмония у детей в практике семейного врача

IV СЪЕЗД СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ И СЕМЕЙНЫХ МЕДСЕСТЕР КЫРГЫЗСТАНА 2021

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИМЕНИ С.Б. ДАНИЯРОВА

*Эшенкулова А. С.*
*Ординатор II года кафедры семейной медицины КГМИПиПК им. С. Б. Даниярова*
*ЦСМ №2*

*Введение*

Во всем мире пневмония является одной из основных причин, приводящих к смерти детей. Именно дети чаще всего страдают от пневмонии. Ежегодно она уносит жизни 1,4 млн детей в возрасте до пяти лет. Это больше, чем СПИД, малярия и корь вместе взятые.

Пневмония в Кыргызстане является одной из основных причин смертности новорожденных (49%) и детей до пяти лет (13%).



*Симптомы*

- Кашель и учащенное дыхание
- Втяжение нижней части грудной клетки
- Лихорадка
- Влажные хрипы при аускультации
- Раздувание крыльев носа
- Кряхтящее дыхание
- Кивательные движения

*Таблица 7. Классификация тяжести пневмонии*

| Признак или симптом | Классификация | Лечение |
|---|---|---|
| Центральный цианоз | **Очень тяжелая пневмония** | — Госпитализация |
| Тяжелая дыхательная недостаточность (например, кивательные движения) | | — Назначьте рекомендуемый антибиотик<br>— Дайте кислород<br>— Следите за проходимостью дыхательных путей |
| Не может пить | | — Жаропонижающие мероприятия, при наличии показаний |
| Втяжение грудной стенки при дыхании | **Тяжелая пневмония** | — Госпитализация<br>— Назначьте рекомендуемый антибиотик<br>— Следите за проходимостью дыхательных путей<br>— Жаропонижающие мероприятия, при наличии показаний |
| Учащенное дыхание ≥ 60/мин у ребенка в возрасте <2 мес; ≥ 50/мин у ребенка в возрасте 2–11 мес; ≥ 40/мин у ребенка в возрасте 1–5 лет | **Пневмония** | — Лечение в домашних условиях<br>— Назначьте подходящий антибиотик на 5 дней<br>— Смягчите горло и облегчите кашель безопасным средством<br>— Инструктируйте мать, в какой ситуации следует немедленно вновь обратиться к врачу<br>— Повторный осмотр через 2 дня |
| Отчетливые влажные хрипы при аускультации | | |

*Лечение*

амоксициллин (50 мг/кг/сут 3 раза в день) в течение 5-7 дней или

Ампициллин 50-100мг/кг/сут 5-7 дней или

6-8 мг/кг/сут триметроприма + сульфаметаксазола 2 раза в день в течение 5-7 дней или

Феноксиметилпенициллин 50-100мг/кг /сут каждые 8 часов 7дней

Если ранее проводилось лечение пневмонии вышеперечисленными препаратами:

1)Амоксиклав 30-40мг/кг/сут 10 дней

2)Цефаклор 20-40мг/кг/сут 2 раза в день 5-7 дней

*Диспансеризация*

Наблюдение врача ГСВ

-дети в возрасте с 3 мес. до 1 года-1 раз в месяц в течение года

-дети в возрасте с 1 года до 3 лет -1 раз в 1,5 месяца в течение года

-старше 3 лет-1 раз в квартал в течение года

Прививочный режим: через 2 месяца после исчезновения симптоматики по обычной схеме

Снятие с учета: через 1 год

*Заключение*

Пневмонию у детей можно предупредить с омощью простых мер, таких как своевременная иммунизация, правильное питание, хороший уход за ребенком, включая мытье рук.

*Контакты:*
0551940214
anipa1994@mail.ru